

## Autour des types union

David Baelde

À rendre le 3 mai

Nous allons considérer plusieurs extensions du  $\lambda$ -calcul simplement typé, en étendant les termes et/ou les types et/ou la réduction  $\rightarrow$  considérée sur les termes. On dira, dans tous les cas, qu'un terme est *neutre* s'il n'est pas de la forme  $\lambda x.u$ . Enfin, comme dans le cours, un ensemble  $S$  est un candidat de réductibilité ( $S \in \mathbf{CR}$ ) quand :

(CR1)  $S \subseteq \mathbf{SN}$  ;

(CR2) si  $u \in S$  et  $u \rightarrow v$  alors  $v \in S$  ;

(CR3) si  $u$  est neutre et  $v \in S$  pour tout  $u \rightarrow v$ , alors  $u \in S$ .

Si un terme n'est pas neutre, on dira que c'est une *valeur* (attention, une valeur n'est pas forcément une forme normale pour  $\rightarrow$ ). On notera  $\mathcal{V}$  l'ensemble des valeurs. Étant donné un ensemble de termes  $S$ , on définit de plus

$$\mathcal{V}(S) = \{ v \in \mathcal{V} : u \rightarrow^* v \text{ pour un } u \in S \}$$

et, pour un terme  $u$ , on écrira  $\mathcal{V}(u)$  pour  $\mathcal{V}(\{u\})$ .

### 1 Réécriture simple

Dans cette section, on étend le  $\lambda$ -calcul simplement typé avec des constructeurs équipés de réductions simples, et on adapte aisément deux résultats clés : la réduction du sujet et la normalisation forte des termes bien typés. Étant donné un ensemble de symboles du premier ordre  $\Sigma$ , on définit les termes du  $\lambda$ -calcul étendu avec  $\Sigma$  (noté  $\Lambda_\Sigma$ ) ainsi :

$$u, v ::= x \mid u v \mid \lambda x.u \mid f(u_1, \dots, u_n) \quad f \in \Sigma \text{ d'arité } n$$

On se donne de plus un ensemble de règles de réécriture de la forme  $f(x_1, \dots, x_n) R u$  où les  $x_i$  sont des variables distinctes et  $u$  est un terme de  $\Lambda_\Sigma$ . On définit  $\rightarrow_{\beta R}$  comme la plus petite relation de réécriture contenant  $\beta$  et  $R$ .

Côté typage, on ajoute la règle suivante aux trois règles du  $\lambda$ -calcul simplement typé :

$$\frac{\{ \Gamma \vdash u_i : T_i \}_{1 \leq i \leq n} \quad \{ \Gamma, x_1 : T_1, \dots, x_n : T_n \vdash r : T \}_{f(x_1, \dots, x_n) R r}}{\Gamma \vdash f(u_1, \dots, u_n) : T} \text{FUN}_R$$

Étant donné un symbole  $f$  d'arité  $n$  et pour lequel on a  $k$  réductions possibles dans  $R$ , la règle ci-dessus a  $n + k$  prémisses.

### Question 1

On prend  $\Sigma = \{d\}$  avec  $d$  d'arité 2, équipé des réductions  $d(x, y) R (x y)$  et  $d(x, y) R y$ . On pose  $I = \lambda x.x$ . Parmi les termes suivants, lesquels sont typables ? Justifier.

- (a)  $d(I, I)$
- (b)  $\lambda x.d(x, x)$

### Question 2

Montrer la réduction du sujet : si  $\Gamma \vdash u : T$  et  $u \rightarrow_{\beta R} v$  alors  $\Gamma \vdash v : T$ . On se concentrera sur la nouveauté dans l'argument par rapport au cas vu en cours.

Nous allons voir que les termes bien typés sont de plus fortement normalisants, en adaptant l'argument de réductibilité vu en cours. Les types étant les types simples du  $\lambda$ -calcul, on peut les interpréter comme dans le cours. On obtient, pour tout  $T$ ,  $\text{RED}_T \in \mathbf{CR}$ .

### Question 3

Montrer le lemme d'adéquation : si  $x_1 : T_1, \dots, x_n : T_n \vdash u : T$  et  $\sigma(x_i) \in \text{RED}_{T_i}$  pour tout  $i$ , alors  $u\sigma \in \text{RED}_T$ . On ne détaillera que le seul nouveau cas, celui de la règle  $\text{FUN}_R$ .

## 2 Unions implicites

On oublie provisoirement l'extension précédente, en reprenant donc les termes usuels du  $\lambda$ -calcul :

$$u, v ::= x \mid u v \mid \lambda x.u$$

Par contre, on étend les types avec les constructions d'union et d'intersection :

$$T, T' ::= \alpha \mid T \Rightarrow T' \mid T \sqcup T' \mid T \sqcap T'$$

On considère la  $\beta$ -réduction usuelle sur les termes, et le système de types obtenu en ajoutant les règles suivantes aux règles du  $\lambda$ -calcul simplement typé :

$$\frac{\Gamma \vdash u : T_1 \quad \Gamma \vdash u : T_2}{\Gamma \vdash u : T_1 \sqcap T_2} \sqcap I \quad \frac{\Gamma \vdash u : T_1 \sqcap T_2}{\Gamma \vdash u : T_i} \sqcap E$$

$$\frac{\Gamma \vdash u : T_i}{\Gamma \vdash u : T_1 \sqcup T_2} \sqcup I \quad \frac{\Gamma \vdash v : T_1 \sqcup T_2 \quad \Gamma, x : T_1 \vdash u : T \quad \Gamma, x : T_2 \vdash u : T}{\Gamma \vdash u[x := v] : T} \sqcup E$$

Dans la règle  $\sqcup E$ , on exige que  $x$  ne soit pas déjà présent dans  $\Gamma$  (et donc pas libre dans  $v$ ).

Nous allons d'abord voir que le système est fortement normalisant.

### Question 4

Soit  $u$  neutre et  $v \in \mathcal{V}$  tel que  $u \rightarrow_{\beta}^* v$ . Montrer que  $u$  a un redex de tête et que sa réduction  $u \rightarrow_t u'$  donne un terme  $u'$  tel que  $u' \rightarrow_{\beta}^* v$ . (Indication : pensez à la réduction standard  $\Rightarrow_s$ .)

### Question 5

Soit  $X \in \mathbf{CR}$  et  $u \in \mathbf{SN}$ . Montrer que  $\mathcal{V}(u) \subseteq \mathcal{V}(X)$  entraîne  $u \in X$ .

### Question 6

En s'appuyant sur les deux questions précédentes, montrer que  $X, Y \in \mathbf{CR}$  entraîne  $X \cup Y \in \mathbf{CR}$ .

On étend l'interprétation des types en posant  $\text{RED}_{T \sqcap T'} = \text{RED}_T \cap \text{RED}_{T'}$  et  $\text{RED}_{T \sqcup T'} = \text{RED}_T \cup \text{RED}_{T'}$ . On a vu en TD que la première construction donne bien un candidat, et la question précédente nous l'assure pour la deuxième construction.

### Question 7

Montrer le lemme d'adéquation pour notre système, en ne détaillant que les cas non traités en cours et TD.

Malgré ce bon départ, nous allons voir que notre système laisse à désirer : il ne jouit pas de la réduction du sujet.

### Question 8

On pose  $I = \lambda x.x$  et  $\Gamma = (x : T, y : T \Rightarrow T_1 \sqcup T_2, z : (T_1 \Rightarrow T_1 \Rightarrow T') \sqcap (T_2 \Rightarrow T_2 \Rightarrow T'))$ . Montrer  $\Gamma \vdash z (y (I x)) (y (I x)) : T'$  au moyen de la règle  $\sqcup E$ .

### Question 9

Étant donné un ensemble de types  $L$ , on note  $L^*$  le plus petit ensemble de types contenant  $L$  et clos par  $\sqcap$  et  $\sqcup$ .

- Montrer que  $\Gamma \vdash z : A$  ssi  $A \in \{T_1 \Rightarrow T_1 \Rightarrow T', T_2 \Rightarrow T_2 \Rightarrow T'\}^*$ .
- Montrer que  $\Gamma, w : B \vdash z t_1 t_2 : C$  ssi il existe un  $1 \leq i \leq 2$  tel que pour tout  $1 \leq j \leq 2$  on a  $\Gamma, w : B \vdash t_j : T_i$ .
- Montrer que  $z (y x) (y (I x))$  n'est pas typable dans l'environnement  $\Gamma$ .

Encore pire, nous montrons maintenant que ce système de types union n'est pas compatible avec l'ajout de réécritures comme vues en première partie. On considère l'extension du langage des termes avec le constructeur binaire  $+$  équipé des réductions  $u + v \mathcal{R}u$  et  $u + v \mathcal{R}v$ .

### Question 10

On pose  $\delta = \lambda x.x x$ ,  $t_1 = \lambda z.z y \delta$  et  $t_2 = \lambda z.\delta$ .

- Montrer que  $(t_1 t_1) \in \mathbf{SN}$ ,  $(t_2 t_2) \in \mathbf{SN}$  mais  $(t_1 t_2) \notin \mathbf{SN}$ .
- Montrer qu'il existe  $T_1, T_2, Y$  et  $U$  tel que  $y : Y \vdash t_i : T_i$  (pour tout  $1 \leq i \leq 2$ ) et  $y : Y, x : T_i \vdash x x : U$ . (On rappelle que les types intersection permettent de typer tout terme fortement normalisant.)
- En déduire qu'on peut typer  $(t_1 + t_2) (t_1 + t_2)$  dans l'environnement  $y : Y$ , conclure que les termes typables ne sont pas tous fortement normalisables.

### Question 11

L'observation précédente implique qu'en présence de réécriture (i.e., avec la réduction  $\rightarrow_{\beta R}$ ) l'union de deux candidats n'est plus forcément un candidat. Le démontrer explicitement en considérant les candidats  $X_1$  et  $X_2$ , où  $X_i$  est le plus petit candidat contenant le terme  $t_i$  de la question précédente.

### 3 Une réunion possible

Nous allons maintenant réunir les deux extensions vues précédemment, de façon à obtenir réduction du sujet et forte normalisation. Pour cela on ajoute une construction aux termes :

$$u, v ::= x \mid u v \mid \lambda x. u \mid f(u_1, \dots, u_n) \mid \text{let } x = v \text{ in } u$$

On considère la réduction  $\rightarrow_{\beta R \text{let}}$ , plus petite relation de réécriture contenant  $\rightarrow_{\beta R}$  et telle que

$$\text{let } x = v \text{ in } u \rightarrow_{\beta R \text{let}} u[x := v] \quad \text{si } v \text{ est une valeur.}$$

Étant donné  $X, Y \in \mathbf{CR}$ , on définit  $X \sqcup Y$  comme le plus petit  $Z \in \mathbf{CR}$  tel que  $X \cup Y \subseteq Z$ . On étend ensuite l'interprétation des types en posant  $\text{RED}_{T \cap T'} = \text{RED}_T \cap \text{RED}_{T'}$  et  $\text{RED}_{T \sqcup T'} = \text{RED}_T \sqcup \text{RED}_{T'}$ .

#### Question 12

Soit  $X, Y \in \mathbf{CR}$ . Montrer que  $u \in X \sqcup Y$  entraîne  $\mathcal{V}(u) \subseteq \mathcal{V}(X \cup Y)$ .

#### Question 13

Montrer le lemme d'adéquation pour notre système.

#### Question 14

Soit  $v$  une valeur. Montrer que si  $\Gamma \vdash v : (T_1 \sqcup T_2) \cap T'$  alors  $\Gamma \vdash v : T_i$  pour un  $1 \leq i \leq 2$ . (On s'autorisera ici à travailler modulo associativité et commutativité sur l'intersection.)

#### Question 15

Montrer la réduction du sujet.