

2.10 Problème de correspondance de Post

Le problème de correspondance de Post (PCP) :

Donnée : Deux suites de mots finies (u_1, \dots, u_n) et (v_1, \dots, v_n) de même longueur

Question : existe-t-il un entier k et une suite d'indices i_1, \dots, i_k tels que

$$u_{i_1} \cdots u_{i_k} = v_{i_1} \cdots v_{i_k}$$

Par exemple : soient

i	1	2	3	4
u_i	a	b	ca	abc
v_i	ab	ca	a	c

Cette instance de PCP a une solution (12314).

Théorème 2.14 *PCP est indécidable.*

On commence par montrer que le problème de correspondance de Post *modifié*, dans lequel on fixe $i_1 = 1$ est indécidable.

On réduit le problème de l'arrêt.

Soient M une machine de Turing et $w \in \Sigma^*$. On note q_f le (seul état d'arrêt de M)

Les mots de PCP modifié :

	mots v_i (dans l'ordre)	mots u_i correspondant	
1.	\triangleleft	$\triangleleft q_0 \$ w \star$	
2.	a	a	pour $a \in \Sigma$
3.	qa	$a'q'$	Si $\delta(q, a) = q', a', \rightarrow$
4.	aqb	$q'ab'$	si $\delta(q, b) = q', b', \leftarrow$
5.	qa	$q'a'$	si $\delta(q, a) = q', a', \downarrow$
6.	$q\star$	$aq'\star$	si $\delta(q, B) = q', a', \rightarrow$
7.	$bq\star$	$q'ba'\star$	si $\delta(q, B) = q', a', \leftarrow$
8.	$q\star$	$q'a\star$	si $\delta(q, B) = q', a', \downarrow$
9.	$\$q_e\star \triangleright$	\triangleright	
10.	\star	\star	
11.	$aq_e\star$	$q_e\star$	
12.	$q_f a$	aq_f	
13.	$q_f \star$	$q_e \star$	

Montrons que PCP a une solution ssi M s'arrête sur w :

Si M s'arrête sur w Soit

$$s_1 = q_0 \$ w \vdash \cdots \vdash w_k q_f w'_k = s_k$$

le calcul de M sur w (les blancs en fin de ruban n'apparaissent pas dans les configurations). Pour tout $i < k$, s_i, s_{i+1} sont de l'une des formes suivantes :

- $s_i = t_i q a w_i$ et $s_{i+1} = t_i a' q' w_i$ avec $\delta(q, a) = q', a', \rightarrow$
- $s_i = t_i a q b w_i$ et $s_{i+1} = t_i q' a b' w_i$ avec $\delta(q, b) = q', b', \leftarrow$
- $s_i = t_i q a w_i$ et $s_{i+1} = t_i q' a' w_i$ avec $\delta(q, a) = q', a', \downarrow$
- L'un des cas ci-dessus en retirant la partie à droite de q (tête de lecture à droite du ruban)...

plus petit indice tel que $u'_{i_k} \neq \epsilon$. Par hypothèse et par construction, $v'_{i_1} \neq \epsilon$ et sa première lettre est $a \notin \{\bullet, \triangleleft\}$. À l'inverse, la première lettre de u'_{i_k} est dans $\{\bullet, \triangleleft\}$. Ce qui est absurde. Il en résulte que $u'_{i_1} \neq \epsilon$. Dans ce cas, la première lettre de u'_{i_1} est dans $\{\bullet, \triangleleft\}$ et donc aussi la première lettre du premier v_{i_k} non vide. Ce n'est possible que si $i_1 = 1$ et cette première lettre est \triangleleft .

Soit maintenant ϕ le morphisme défini sur $(\Sigma \cup \{\bullet, \triangleleft, \triangleright\})^*$ par $\phi(\bullet) = \phi(\triangleleft) = \phi(\triangleright) = \epsilon$ et $\phi(a) = a$ sinon. On montre, par récurrence sur k que $\phi(u'_{i_1} \cdots u'_{i_k}) = u_1 \cdot u_{i_2} \cdots u_{i_k}$ et $\phi(v_{i_1} \cdots v_{i_k}) = v_1 \cdot v_{i_2} \cdots v_{i_k}$, si $1 \leq k < m$. Il en résulte que, si PCP a une solution, alors PCP modifié aussi, en prenant l'image par ϕ .

2.11 Problèmes de pavages

Le problème de pavage de $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ (les définitions sont semblables pour d'autres sous-ensembles de $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$) est défini par :

Donnée : un ensemble fini $T = \{t_0, \dots, t_k\}$ de *tuiles* et deux sous-ensembles H, V de $T \times T$.
(Les relations de compatibilité horizontale et verticale).

Question : existe-t-il une fonction de pavage $f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mapsto T$ telle que $f(1, 1) = t_0$ et, pour tout $i, j \in \mathbb{N}$, $(f(i, j), f(i + 1, j)) \in H$, $(f(i, j), f(i, j + 1)) \in V$.

Théorème 2.15 *Le problème de savoir, étant donnés T, V, H si $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ est pavable, est indécidable.*

On réduit le problème de l'arrêt. Soit M, w les données du problème de l'arrêt et $k = \max(1, |w|)$. On suppose sans perte de généralité que la machine ne rentre jamais dans l'état initial (autrement dit, seul le premier mouvement utilise l'état initial) et qu'elle n'écrit jamais de blanc.

On choisit pour $T = (\Sigma \cup Q)^{k+3} \cap \Sigma^*(Q + \epsilon)\Sigma^*$ (autrement dit, les mots de longueur $k + 3$ contenant au plus un symbole de Q).

$$H = \{(atc, tcb) \mid atc, tcb \in T, a, c, b \in \Sigma \cup Q, c = B \Rightarrow b = B\}$$

$$\begin{aligned} V = & \left\{ \begin{array}{ll} (\alpha qa\beta, & \alpha a'q'\beta) \mid \alpha\beta \in \Sigma^{k+1}, a \in \Sigma, q \in Q, \delta(q, a) = (q', a', \rightarrow) \end{array} \right\} \\ \cup & \left\{ \begin{array}{ll} (\alpha q, & \alpha a') \mid \alpha \in \Sigma^{k+2}, a' \in \Sigma, q \in Q, \delta(q, a) = (q', a', \rightarrow) \end{array} \right\} \\ \cup & \left\{ \begin{array}{ll} (a\alpha, & q'\alpha) \mid \alpha \in \Sigma^{k+2}, q \in Q, \delta(q, a) = (q', a', \rightarrow) \end{array} \right\} \\ \cup & \left\{ \begin{array}{ll} (\alpha bqa\beta, & \alpha qba'\beta) \mid \alpha\beta \in \Sigma^k, a, b \in \Sigma, q \in Q, \delta(q, a) = (q', a', \leftarrow) \end{array} \right\} \\ \cup & \left\{ \begin{array}{ll} (qa\beta, & ba'\beta) \mid \beta \in \Sigma^{k+1}, a, b \in \Sigma, q \in Q, \delta(q, a) = (q', a', \leftarrow) \end{array} \right\} \\ \cup & \left\{ \begin{array}{ll} (\beta a, & \beta q') \mid \beta \in \Sigma^{k+2}, a \in \Sigma, \delta(q, a) = (q', a', \leftarrow) \end{array} \right\} \\ \cup & \left\{ \begin{array}{ll} (\alpha qa\beta, & \alpha q'a'\beta) \mid \alpha\beta \in \Sigma^{k+1}, a \in \Sigma, q \in Q, \delta(q, a) = (q', a', \downarrow) \end{array} \right\} \\ \cup & \left\{ \begin{array}{ll} (\alpha q, & \alpha q') \mid \alpha \in \Sigma^{k+2}, q \in Q, \delta(q, a) = (q', a', \downarrow) \end{array} \right\} \\ \cup & \left\{ \begin{array}{ll} (\alpha, & \alpha) \mid \alpha \in \Sigma^{k+3} \end{array} \right\} \end{aligned}$$

Enfin, on demande que le pavage satisfasse $f(1, 1) = q_0\$wB$.

Un pavage des n premières lignes horizontales du quart de plan supérieur correspond alors à une succession de n configurations de la machine de Turing, à partir de la configuration initiale. Plus précisément, si l'on ne retient que la première lettre de chaque tuile de la ligne n , on obtient la n ième configuration de M .

On montre ce résultat par récurrence sur n :

- pour $n = 1$, la première ligne contient la configuration initiale ; $f(1, 1) = q_0\$wB$ et donc $f(1, 2) = \$wBB$. Par récurrence sur $m \geq 1$, $f(1, m+1) = w_2B^{m+1}$ où w_2 est un suffixe de $\$wB$ de longueur $k+2-m$. En effet, étant donné $f(1, m) = w_2B^{m+1}$ avec $m \geq 1$, une seule tuile a pour membre gauche $f(1, m) : (w_2B^{m+1}, w_3B^{m+2})$ où $w_2 = aw_3$ avec $a \in \Sigma$.

- Si la suite des premières lettres des tuiles de la ligne n est une configuration $\gamma = w_1qaw_2$ de la machine de Turing, alors la suite des premières lettres des tuiles de la ligne $n+1$ est la configuration suivante de la machine : soit m la position de q dans γ . Supposons d'abord que $m > 1$. Pour $m-1 \geq p \geq \max(1, m-k-1)$, $f(n, p) = w'_1bqaw'_2$ où w'_1b est le suffixe de longueur $m-p$ de w_1 et w'_2 est le préfixe de longueur $k+p+1-m$ de w_2 , éventuellement complété de blancs.

$f(n+1, p)$ est alors donné par :

- $w'_1qba'w'_2$ si $\delta(q, a) = (q', a', \leftarrow)$,
- $w'_1bqa'w'_2$ si $\delta(q, a) = (q', a', \downarrow)$,
- $w'_1ba'q'w'_2$ si $\delta(q, a) = (q', a', \rightarrow)$.

On conclut, grâce aux compatibilités verticales. Par exemple, $p \geq m+2$, alors $f(n, p) \in \Sigma^{k+3}$ et $f(n+1, p) = f(n, p)$. En effet, les seules tuiles verticales compatibles sont (α, α) et $(\alpha b, \alpha q')$ (avec $\delta(q, a) = (q', a', \leftarrow)$). Mais on montre que ce dernier cas n'est pas possible en considérant $f(n, p+1)$: comme $p > m+1$, $f(n, p+1) \in \Sigma^{k+3}$ et donc, par compatibilité verticale, $f(n+1, p+1) \in \Sigma^{k+3} \cup Q \cdot \Sigma^{k+2}$. Si l'on avait $f(n+1, p) = \alpha q'$, on aurait une tuile horizontale de la forme $(\alpha q', \beta q'')$ ou $(\alpha q', \beta)$, ce qui n'est pas le cas. De même, pour $p < m-k-2$, $f(n+1, p) = f(n, p)$. Restent les cas $p = m-k-2$, $p = m$, $p = m+1$ pour lesquels on montre par compatibilités horizontale et verticale que l'on obtient les lettres voulues.

Enfin, si $m = 1$, le seul mouvement possible est à droite et la seule tuile verticale possible impose $f(n+1, 1) = \$q'w'$ si $\delta(q, \$) = (q', \$, \rightarrow)$. Puis, pour $p > 2$, $f(n+1, p) = f(n, p)$ comme ci-dessus et $f(n+1, 2) = q'w'b$ par compatibilités verticale et horizontale.