Analyse statique de programmes

Analyse statique

- But: découvrir **automatiquement** des propriétés (simples) des programmes
- Applications:
 - compilateurs optimisants (gcc, etc.)
 - preuve automatique d'absence d'erreurs à l'exécution (Polyspace, Astrée, etc.)
 - base d'autres outils (en sécurité par ex.)

Architecture d'un compilateur (pas le vôtre!)

Un exemple

```
int f (int m, int n) { int p = m+n; return p+3; }
```

compilé par gcc 2.8.1 sans option en:

Mnémoniques assembleur	Explication
<code>movl 8(%ebp),%eax</code>	mettre m dans %eax
<code>movl 12(%ebp),%edx</code>	mettre n dans %edx
<code>leal (%edx,%eax),%ecx</code>	calculer %ecx := %eax + %edx
<code>movl %ecx,-4(%ebp)</code>	inutile... car p ne sera jamais plus utilisée
<code>movl -4(%ebp),%edx</code>	remplaçable par <code>movl 8(%ebp),%edx</code>
<code>addl \$3,%edx</code>	ajouter 3 à %edx
<code>movl %edx,%eax</code>	retourner %eax

Propriété à démontrer,
automatiquement

Quelques propriétés

- *live variables*: variables définies à la ligne n qui seront possiblement utilisées plus tard
- *dead code*: code qui ne sera jamais exécuté
- *array overflow*: débordement de tableau
- *arithmetic overflow*: débordement arithmétique (cf. Ariane 5)

Le théorème de Rice

- **Thm:** toute propriété extensionnelle et non-triviale de prgms est **indécidable**.
- Extensionnelle = ne dépend que de la sémantique
- Non-triviale: fausse d'au moins 1 prgm, et vraie d'au moins 1 prgm
- (pour un langage de prog. Turing-complet.)

Exemple

- La propriété « y a-t-il du code mort dans mon code? » est indécidable
- (Mais... ceci n'est pas extensionnel: comment utilise-t-on Rice ici?)
- Morale: « toute propriété intéressante de programmes est indécidable ».

L'interprétation abstraite

- On va construire des **approximations** calculables de propriétés P de prgms:
 - Si l'analyseur dit OK, P est vraie
 - Sinon, on ne sait pas...
 - mais l'analyseur termine

Illustration: la règle des signes

- But: détecter quelles vars x sont ≥ 0 et à quelles lignes d'un prgm π
- Deux signes: '+' et '-'
- Règles de calcul:
'+' x '+' = '+' '+' x '-' = '-' etc.
- Quelles règles pour l'addition?

Top

- ‘+’ + ‘−’ = $\top$ (top, « je ne sais pas, ça peut être n’importe quoi »)
- Pas $\perp$ (bottom): pourquoi?

Concrétisation

- = fonction de sémantique γ des valeurs abstraites (ici, les signes) vers l'ensemble des propriétés (=sous-ensembles des valeurs possibles)
- $\gamma('+') = \{n \in \mathbf{Z} \mid n \geq 0\}$
 $\gamma('-') = \{n \in \mathbf{Z} \mid n < 0\}$
 $\gamma(\top) = \mathbf{Z}$... monotone!
 $\gamma(\perp) = \emptyset$

Sémantique abstraite

- Soit $L^\#$ un treillis complet
(de valeurs abstraites),
 $\text{Env}^\# = \text{Var} \times \text{Ligne} \rightarrow L^\#$
(treillis complet aussi)
- $\llbracket \text{skip} \rrbracket^\# \rho^\# = \rho^\#$
 $\llbracket x=e \rrbracket^\# \rho^\# = \rho^\#[x \mapsto \llbracket e \rrbracket^\# \rho^\# \vee \rho^\#(x)]$
 $\llbracket \text{if } e \text{ then } c \text{ else } c' \rrbracket^\# \rho^\# = \llbracket c \rrbracket^\# \rho^\# \vee \llbracket c' \rrbracket^\# \rho^\#$
 $\llbracket \text{while } e \text{ do } c \rrbracket^\# \rho^\# = \text{lfp}_{\rho^\#} (\llbracket c \rrbracket^\#)$

lfp_v

- $f: L^\# \rightarrow L^\#$ est **inflationnaire** ssi $f(x) \geq x$
- **Thm:** Si $f: L^\# \rightarrow L^\#$ est mon.+inflationnaire, pour tout $V \in L^\#$, f a un plus petit point fixe **au-dessus de V** . On le note $\text{lfp}_V(f)$.
(Note: monotonie pas nécessaire [Bourbaki-Witt])
- *Dém.:* Tarski sur le treillis complet $\uparrow V$.
 - Inflationnarité nécessaire: pourquoi?
 - Quels sont les sups, les infs, dans $\uparrow V$?

Autre démonstration

- **Thm:** Si $f: L^\# \rightarrow L^\#$ est mon.+inflationnaire, pour tout $V \in L^\#$, f a un plus petit point fixe **au-dessus de V** . On le note $\text{lfp}_V(f)$.
- On pose $f^V(x^\#) = f(x^\#) \vee V$.
Alors $\text{lfp}_V(f) = \text{lfp}(f^V)$
(les points fixes de f^V sont exactement les points fixes de $f \geq V$.)

Correction

- (Supposons une sémantique petit pas avec des règles de la forme $(c, \rho) \rightarrow (c', \rho')$ pour simplifier)
- **Prop:** si $\rho(x) \in \gamma(\rho^\#(x))$ pour tout x ,
et si $(c, \rho) \rightarrow^* (c', \rho')$
alors $\rho'(x) \in \gamma((\llbracket c \rrbracket^\# \rho^\#)(x))$ pour tout x .
- **Dém.:** récurrence + analyse de cas

Faire mieux

- Peut-on, connaissant γ et la sémantique concrète $(c, \rho) \rightarrow (c', \rho')$, **déduire** la sémantique abstraite?
... de sorte que cette dernière soit la plus précise possible?
- Correspondances de Galois

Correspondances de Galois

- Soit $\gamma : L^\# \rightarrow L$, $\alpha : L \rightarrow L^\#$ monotones.
Les propriétés suivantes sont équivalentes:
- pour tous $x, y^\#$, $\alpha(x) \leq y^\#$ ssi $x \leq \gamma(y^\#)$
- pour tous $x, y^\#$, $y^\# \leq \alpha(\gamma(y^\#))$, $x \leq \gamma(\alpha(x))$
- On dit alors que $\alpha \dashv \gamma$ est une **correspondance de Galois**

Correspondances de Galois

- Soit $\gamma : L^\# \rightarrow L$, $\alpha : L \rightarrow L^\#$ monotones, L et $L^\#$ treillis complets et $\alpha \dashv \gamma$ (pensez $L = \mathbb{P}(\text{Val})$)
- Alors $\alpha(x)$ est la valeur abstraite $y^\#$ **la plus précise** (la plus petite) qui soit **correcte** par rapport à x ($x \leq \gamma(y^\#)$)

Correspondances de Galois

Galois et points fixes

- **Thm:** Soit L treillis complet, $f : L \rightarrow L$ monotone, et $L : \alpha \dashv \gamma : L^\#$, alors
$$\text{lfp}(f) \leq \gamma(\text{lfp}^\#(f^\#)) \text{ où } f^\# = \alpha \circ f \circ \gamma$$

Galois et points fixes

- **Thm:** Soit L treillis complet, $f : L \rightarrow L$ monotone, et $L : \alpha \dashv \gamma : L^\#$, alors
$$\text{lfp}(f) \leq \gamma(\text{lfp}^\#(f^\#)) \text{ où } f^\# = \alpha \circ f \circ \gamma$$
- **Dém.:** $\text{lfp}^\#(f^\#) = f^\#(\text{lfp}^\#(f^\#))$

Galois et points fixes

- **Thm:** Soit L treillis complet, $f: L \rightarrow L$ monotone, et $L: \alpha \dashv \gamma: L^\#$, alors
$$\text{lfp}(f) \leq \gamma(\text{lfp}^\#(f^\#)) \text{ où } f^\# = \alpha \circ f \circ \gamma$$
- **Dém.:** $\text{lfp}^\#(f^\#) = f^\#(\text{lfp}^\#(f^\#))$
donc $\alpha(f(\gamma(\text{lfp}^\#(f^\#)))) \leq \text{lfp}^\#(f^\#)$ (en fait =)

Galois et points fixes

- **Thm:** Soit L treillis complet, $f : L \rightarrow L$ monotone, et $L : \alpha \dashv \gamma : L^\#$, alors
$$\text{lfp}(f) \leq \gamma(\text{lfp}^\#(f^\#)) \text{ où } f^\# = \alpha \circ f \circ \gamma$$
- **Dém.:** $\text{lfp}^\#(f^\#) = f^\#(\text{lfp}^\#(f^\#))$
donc $\alpha(f(\gamma(\text{lfp}^\#(f^\#)))) \leq \text{lfp}^\#(f^\#)$ (en fait =)
donc $f(\gamma(\text{lfp}^\#(f^\#))) \leq \gamma(\text{lfp}^\#(f^\#))$ ($\alpha \dashv \gamma$)

Galois et points fixes

- **Thm:** Soit L treillis complet, $f : L \rightarrow L$ monotone, et $L : \alpha \dashv \gamma : L^\#$, alors
$$\text{lfp}(f) \leq \gamma(\text{lfp}^\#(f^\#)) \text{ où } f^\# = \alpha \circ f \circ \gamma$$
- **Dém.:** $\text{lfp}^\#(f^\#) = f^\#(\text{lfp}^\#(f^\#))$
donc $\alpha(f(\gamma(\text{lfp}^\#(f^\#)))) \leq \text{lfp}^\#(f^\#)$ (en fait =)
donc $f(\gamma(\text{lfp}^\#(f^\#))) \leq \gamma(\text{lfp}^\#(f^\#))$ ($\alpha \dashv \gamma$)
i.e., $\gamma(\text{lfp}^\#(f^\#))$ post-point fixe de f

Galois et points fixes

- **Thm:** Soit $L, L^\#$ treillis complet, $f: L \rightarrow L$ monotone, et $L: \alpha \dashv \gamma: L^\#$, alors

$$\text{lfp}(f) \leq \gamma(\text{lfp}^\#(f^\#)) \text{ où } f^\# = \alpha \circ f \circ \gamma$$

- **Dém.:** $\text{lfp}^\#(f^\#) = f^\#(\text{lfp}^\#(f^\#))$
donc $\alpha(f(\gamma(\text{lfp}^\#(f^\#)))) \leq \text{lfp}^\#(f^\#)$ (en fait =)
donc $f(\gamma(\text{lfp}^\#(f^\#))) \leq \gamma(\text{lfp}^\#(f^\#))$ ($\alpha \dashv \gamma$)
i.e., $\gamma(\text{lfp}^\#(f^\#))$ post-point fixe de f
donc $\geq$ le plus petit, qui est $\text{lfp}(f)$ (Tarski).

Galois et points fixes

- **Thm:** Soit $L, L^\#$ treillis complet, $f: L \rightarrow L$ mon.+inflationnaire, et $L: \alpha \dashv \gamma: L^\#$, alors si $V \leq \gamma(V^\#)$ et $V^\# \in \text{Im } \alpha$ on a:

$$\text{lfp}_V(f) \leq \gamma(\text{lfp}_{V^\#}^\#(f^\#)) \text{ où } f^\# = \alpha \circ f \circ \gamma$$

- **Dém.:** soit $V^\# = \alpha(V')$
 $\alpha \dashv \gamma$ se restreint à $\uparrow V': \alpha \dashv \gamma: \uparrow V^\#$
puis $\text{lfp}_V(f) \leq \text{lfp}_{V'}(f)$ (par définition de lfp_V .)

Galois et points fixes

- **Thm:** Soit $L, L^\#$ treillis complet, $f: L \rightarrow L$ mon.+inflationnaire, et $L:\alpha \dashv \gamma: L^\#$, alors si $V \leq \gamma(V^\#)$ et γ **injective** on a:
$$\text{lfp}_V(f) \leq \gamma(\text{lfp}_{V^\#}^\#(f^\#)) \text{ où } f^\# = \alpha \circ f \circ \gamma$$
- **Dém.:** il suffit de voir que α est alors surjective. En effet, on a toujours $\gamma(x^\#) = \gamma(\alpha(\gamma(x^\#)))$ (exercice).

Correction

- Pour $\varrho : \text{Var} \rightarrow \mathbb{P}(\text{Val})$

- $\llbracket \text{skip} \rrbracket^b \varrho = \varrho$

$$\llbracket x=e \rrbracket^b \varrho = \varrho[x \mapsto \varrho(x) \cup \llbracket e \rrbracket^b \varrho]$$
$$\llbracket \text{if } e \text{ then } c \text{ else } c' \rrbracket^b \varrho = \llbracket c \rrbracket^b \varrho \cup \llbracket c' \rrbracket^b \varrho$$
$$\llbracket \text{while } e \text{ do } c \rrbracket^b \varrho = \text{lfp}_{\varrho} (\llbracket c \rrbracket^b)$$

Correction

- On démontre une fois pour toutes:
- **Prop:** si $(c, \rho) \rightarrow^* (c', \rho')$
et pour tout $x, \rho(x) \in \varrho(x)$, alors
pour tout $x, \rho'(x) \in (\llbracket c \rrbracket \vdash \varrho)(x)$.

Transfert

- **Thm:** si ϱ est correct par rapport à $\rho^\#$, (i.e., pour tout x , $\varrho(x) \subseteq \gamma(\rho^\#(x))$), alors $\llbracket c \rrbracket^b \varrho$ est correct par rapport à $\llbracket c \rrbracket^\# \rho^\#$.
- **Dém.:** on utilise ‘Galois et points fixes’ pour les boucles.
- Fournit automatiquement des interprétations abstraites correctes $\llbracket c \rrbracket^\# \rho^\#$.

Calculabilité

- Si $L^\#$ est de hauteur finie (ex: pour les signes, hauteur 2), alors $\text{lfp}^\#_{V^\#}(f^\#)$ est le sup de la chaîne croissante **finie** des $f^{\#n}(V^\#)$.
- Sinon, techniques d'élargissement (Cousot), d'itérations sur les politiques (Goubault&Putot — pas moi).